

JV-	Sp		observações - UT
69	sb 360/88	J = 300/86	
70	blacos		
71	sb 190/65		
72	sb 172/70		
73	sb 7 90/20	? F 12/40	
74	—		
75	sb 150/66		
76	sb 164/75		
77	sb 162/76		
78	sb 164/85		
79	Sx/S _T → Lb (an. dir.) 174/75	240/70 ; S _f = 290/85 ; S _c ↔ L _c 270/68 242/75	horizontais? (anotados?)
80	Sx/S _c 355/90	Sx 348/83 (400m a N)	idem?
81	Sx/S _c ? 190/90	S ₁ 113/68, S ₂ 264/85, S ₃ 138/88	
82	Sx 314/85	S _c 187/80, d.b. 20/80	
83	sb 148/83		
84	sb 204/65	F 316/85	
85	sb 150/75	sb = 196/75 a 400 m p/ NE	
86	sb * 325/90	* 400 m p/ NE	
87	sb 169/90		
88	Sx 184/55		
89	sb 210/27		
90	sb 150/30		
91	sb 197/60		
92	sb 150/30		
93	sb 220/68		
94	sb 144/67	F 230/60 ; J 86/60 e 112/60	
95	sb 336/85		
96	sb 154/75	J 78/65 168/54 no limite N da área	este lançamento a altitude errada no mapa lit.
97	sb 40/90	sb = 168/54 no limite N da área	
98	sb 200/70		
99	sb 168/70		
100	sb/S _c ? 200/70	sb 342,55 (400m p/ SW)	
101	sb/S _c → Lm 10/70	J (subam.) 324/65 ; sb (300m p/ NE) 210/90 184/25	
102	sb 190/52	J ₁ (an. a sub) 348/47 e J ₂ (an.) 40/40	

	Sp		Observações - UT
3	Sb 174/67		
4	blocos		
5	Sx//Sx 322/68	J (an. amb) 220/80 ; 400m a NW - Sb = 130/80	
6	Sx/ISC 170/90	Sx (extremo NW do este) 310/88 ; 264/88	xistos fol. e hornfels (substituídos)
7	Sx/ST 156/80	desenvolve dobras intrafoliares c/ p.a. // Sx/ST	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			